

Impfkalender für Standardimpfungen

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am RKI, Stand August 2013

ALTERNATIVE IMPFSTOFF	ALTER	Monate					Jahre				
		6	2	3	4	11-14	15-23	5-6	9-17	ab 18	>60
Tetanus			G1	G2	G3	G4	N	A	A	A ^{f)}	ggf. N
Diphtherie			G1	G2	G3	G4	N	A	A	A ^{f)}	ggf. N
Pertussis			G1	G2	G3	G4	N	A	A	A ^{f)}	ggf. N
Polio (IPV)			G1	G2 ^{a)}	G3	G4	N	N	A	ggf. N	ggf. N
Haemophilus influenzae Typ b (Hib)			G1	G2 ^{a)}	G3	G4	N				
Hepatitis B			G1	G2 ^{a)}	G3	G4	N	N	N		
Pneumokokken ^{c)}			G1	G2	G3	G4	N				S
Rotaviren		G1 ^{b)}	G2	(G3)							
Meningokokken C						G1 ab 1 Jahr		N	N		
Masern						G1	G2	N	N	S ^{d)}	
Mumps-Röteln						G1	G2	N	N		
Varizellen						G1	G2	N	N		
Influenza											S ^{g)}
HPV								S ^{e)}			

- G: Grundimmunisierung
 A: Auffrischungsimpfung, möglichst nicht früher als 5 Jahre nach der vorhergehenden letzten Dosis
 S: Standardimpfung mit allgemeiner Anwendung = Regelimpfung
 N: Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

- a) Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.
 b) Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich
 c) Impfung für Kinder bis 2 Jahren mit Konjugat-Impfstoff. Standardimpfung für Personen >60 Jahre mit Polysaccharid-Impfstoff.
 d) gilt nur für Masern: einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen >18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, vorzugsweise mit einem MMR-Impfstoff
 e) Standardimpfung mit 3 Dosen alle für Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren
 f) Td-Auffrischung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- / Tdap-IPV-Kombination
 g) jährlich mit dem von der WHO empfohlenen aktuellen Impfstoff